

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér përdoruesin

NIKOTINAMID

Tableta - 200 mg
(Nikotinamid)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se tē filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund tē keni nevojë ta lexoni përshtetjet.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar pér ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund tē kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqështet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Nikotinamid dhe përsë përdoret
- Përpëra se tē merrni Nikotinamid
- Si ta merrni Nikotinamid
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Nikotinamid
- Informacion i mëtejshëm.

1. ÇFARË ËSHTË NIKOTINAMID DHE PËRSE PËRDORET

Nikotinamidi dhe acidi nikotinik (vitamina PP) bëjnë pjesë në vitaminat e tretshme në ujë, të grupit të vitaminës B. Në organizëm shndërrohen në nikotinamidatenindinukleotid (NAD) dhe në fosfat të nikotinamidatenindinukleotid (NADP). Këto dy produkte tē fundit janë koenzima të rëndësishme që marrin pjesë në proceset e frymëmarrjes.

Pamjaftueshmëria e acidit nikotinik shfaqet kur marrja me ushqimet është e papërshtatshme.

Pamjaftueshmëria shpie në zhvillimin e një sindromi që njihet me emrin pelagra, e cila karakterizohet me lezione të lëkurës, sidomos të sipërfaqeve që eksponohen në dritën e diellit, me hiperpigmentim dhe hiperkeratinizim. Mund tē shfaqen edhe simptoma të tjera, si: diarre, dhimbje barku, glosit, stomatit, anoreksi, dhimbje koke, letargji dhe çregullime mendore e neurologjike.

Indikohet në:

- rastet e rritjes së nevojave pér nikotinamid, si p.sh. në periudhën e shtatzënise dhe të ushqyerjes së fémijëve me gjit;
- personat e dobësuar dhe në diabetikët;
- një varg sëmundjesh organike dhe funksionore të enëve të trurit (arterosklerozë obliterante, emboli trunore, migrenë spastike);
- sëmundje organike të enëve periferike (morbus Buergeri);
- dëmtime funksionore të enëve periferike, si sëmundja Reino, akrocianiza;
- sëmundje infektive, çregullime të metabolizmit, alergji, anoreksi, të vjella;

- oftalmologji; përdoret në djegje të konjunktivës dhe kornesë nga nxehësia dhe lëndët kimike, në sëmundje të fundus okuli dhe të nervit optik me bazë vaskulare;
- otorino-laringologji; indikohet në dëmtimet spastike të dëgjimit dhe dëmtimet vestibulare;
- stomatit, glosite, xinxhivite, afte;
- dermatologji; përdoret në ekzemë, morth, dermatite toksike, alopeci areata.

Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Nikotinamid pér një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se doni tē din pse ju është dhënë Nikotinamid.

2. PËRPARA SE TË MERRNI NIKOTINAMID

Mos merrni Nikotinamid në qoftë se:

- jeni me gjendje hemoragiike (hemorragji në traktin gastrointestinal, hemorragji cerebrale, hemoptizi, hematuri);
- vuani nga glomerulonefriti akut;
- vuani nga vese të dekompenzuara të zemrës;
- keni kaluar infarkt miokard.

Tregoni kujdes të veçantë me Nikotinamid

Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se:

- jeni tē sëmurrë me tē dhëna të mëparshme pér ulçer peptike;
- jeni tē sëmurrë me gutë;
- keni dëmtim të funksionit të mëlçisë;
- pacienti është i moshuar.

Marrja e barnave të tjera

Traitimi i njëkohshëm me barna të tjera mund tē ndikojë ose të ndikohet nga Nikotinamid. Ju lutemi tē kontaktioni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marrë pa recetë. Mos harroni tē informoni mjekun tuaj pér traitimin me Nikotinamid në qoftë se ju jetep ndonjë bar tjetër gjatë traitimit, sidomos këtë të mëposhtmit:

- beta-blockues, sepse efekti antihipertensiv i tyre mund tē fuqizohet nga Nikotinamid;
- lovastatin, sepse përdorimi në të njëjtën kohë me tē mund ta shtoje rezikun e miopatisë.

Marrja e Nikotinamid me ushqim dhe pijë

Nuk ka tē dhëna pér bashkëveprimin e këtij bari me ushqimin dhe pijen.

Shtatzënia

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni të ngeleni shtatzënë. Nikotinamid është i indikuar tē përdoret në shtatzënë.

Ushqimi me gjit

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqjeni foshnjen me qumësht gjiri. Nikotinamid është i indikuar tē përdoret gjatë ushqyerjes me gjit.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Nikotinamid nuk e ul aftësinë tuaj pér tē drejtuar automjetin ose pér tē punuar me makineri.

Informacion i rëndësishëm pér disa nga përbërësit e Nikotinamid

Nikotinamid përbëhet me laktozë. Flisni me mjekun tuaj përpëra se tē merrni këtë bar në qoftë se jeni në dijeni

se vuani nga intoleranca ndaj disa sheqernave.

3. SI TA MERRNI NIKOTINAMID

Doza e zakonshme është 200 mg, 2-3 herë në ditë. Gjithmonë merrini tabletat Nikotinamid vetëm sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se ndjeni që efektet e Nikotinamid janë shumë të fortë ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Mjeku juaj mund t'u kërkojë tē merrni Nikotinamid pér një kohë më të gjatë. Pyesni mjekun tuaj pér këshillë në qoftë se nuk jeni i sigurt pér sa kohë duhet ta merrni.

Në qoftë se keni marrë më shumë Nikotinamid

Në qoftë se keni marrë më shumë Nikotinamid se sasia që duhet tē merrni, ose në qoftë se fémijët e kanë marrë gabimish këtë bar, ju lutemi tē kontaktioni mjekun tuaj, spitalin ose tē telefononi urgjencën pér tē marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet tē ndërmerren.

Në qoftë se keni harruar tē merrni Nikotinamid

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur tē jetë koha pér marrjen e zakonshme të saj.

Mos merrni një dozë tē dyfishtë pér tē plotësuar dozën e harruar.

Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Të gjitha barnat mund tē shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze, shumicën e herëve jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund tē mos ju shfagjet asnjë prej tyre. Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore të mëposhtme ju shqetëson. Përdorimi pér kohë të gjatë dëme me doza tē larta mund tē favorizojë këtë efekte:

- dejgenerime konjunktive dhe yndyrore;
- hipertrofi të mëlçisë.

Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI NIKOTINAMID

Mbajeni larg fémijëve!

Mos e përdorni barin pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.

Mos e ruani mbi 25°C!

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbënë Nikotinamid?


Lënda vepruese është nikotinamidi.

Cdo tabletë përbënban 200 mg nikotinamidi. Përbërësit e tjerë janë: amidon, laktozë, povidon, celulozë mikrokristalore, stearat magnezi, talk dhe glikolat natriumi i amidonit.

Përbajtja e paketimit

Kuti me 30 tableta.

Shpjegues i ikonave ilustruese pér paketim:



Mbjatësi i autorizimit pér tregtim (MAT) dhe prodhuesi:

PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë - SHQIPÉRI

Ky fletëudhëzues u formulaua pér herë të fundit në Maj 2015.

CROPPING AREA 12 x 19 cm

PAY ATENTION, all the layers are visible.

If you have to print this document please check or uncheck the specific layers.

SPECIFICATION