

I FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për përdoruesin

CUTASON

Tableta – 5 mg

Lënda vepruese: Prednizon

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.

- Rruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos ja jepni personave të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efektëve anësorë bëhet serioz ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, kontaktoni mjekun ose farmacistin tuaj

Në këtë fletëudhëzues:

- Cfarë është Cutason dhe përse përdoret
- Përpara se të merrni Cutason
- Si ta merrni Cutason
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Cutason
- Informacion i mëtejshëm

1. CFARË ËSHTË CUTASON DHE PËRSE PËRDORET

Cutason është një glukokortikoid (hormon i gjendrës mbiveshkore) që ndikon në metabolismëm, në bilancin e kriprëve (elektrolitëve) dhe në funksionimin e indeve.

Cutason indikohet në sëmundjet që kërkojnë një terapi sistematike me glukokortikoidë.

Në varësi të mënyrës si paraqitet dhe gravitetit të sëmundjes, këtu përfshihen (Tabela me **dozimë nga a në d dhe dozimi e**, shih pikën 3. Si ta merrni Cutason):

Si terapi zëvendësuese e hormoneve në:

- insuficiencën ose dështimin e gjendrës mbiveshkore për shkak të ndryshme (si p.sh. sëmundja Addison, hiperplazia kongjenitale e gjendrës mbiveshkore, heqja kirurgjike e gjendrës mbiveshkore, insuficienca hipofizarë), pasi nëse nuk ka efekt të rritjes (në këto raste kortizoni dhe hidrokortizoni janë zgjedhja e parë)
- gjenjë stresi të shaktuara nga përdorimi afatgjatë i kortikoidëve.

Crregullime reumatike:

- gjatë fazave aktive të inflamacionit vaskular (Dozimi: a,b):
 - poliarterit nodoz (nëse pacienti vuan nga hepatiti B, kohe e trajtimit duhet kufizuar në dy javë)
 - arterit me qeliza gigante, dhimbje dhe ngurtësi të muskujve (polimialgi reumatike) (Dozimi: c)
 - inflamacion i arteries temporale (arterit) (Dozimi: a), në humbjen akute të shikimit jepen fillimisht doza sulmi glukokortikoidësh endovenë e më pas vazhdohet trajtimi kronik duke mbajtur nën kontroll sedimentimin e eritrociteve

- gjatë fazave aktive të sëmundjeve reumatike që prekin organet e brendshme (Dozimi: a, b): lupus eritematoz që prek organet e brendshme, dobësi dhe dhimbje e muskujve (polimioziti), inflamacion i kartilagjos (polychondritis chronica atrophicans), çrregullime të indit lidhor (MCTD)
 - artriti reumatoid me zhvillim të shpejtë dhe të rëndë (Dozimi: a deri në d) si p.sh. forma shkatërruese të rritkeshme ose ato që prekin artikulationet (Dozimi: b)
 - sëmundje të tjera reumatike që prekin artikulationet, nëse sëmundja për nga graviteti kërkon këtë lloj trajtimi dhe nëse disa barna për trajtimin sëmundjeve reumatike (AIJS) nuk kanë dhënë efekt ose nuk mund të përdoren
 - inflamacion i shtyllës kurrizore (spondiloartrit), inflamacion i shtyllës kurrizore (spondilit ankilozant) që prek dhe artikulatione të tjera si ato të kraheve dhe këmbëve (Dozimi: b, c), psoriazë që prek artikulationet (artriti psoriazic) (Dozimi: c, d), çrregullime gastrointestinale që shoqërohen me inflamacion të rëndë dhe prekin artikulationet (artropati enteropatike) (Dozimi: a)
 - artrit që vjen si pasojë e një tjetër sëmundjeje ekzistuese (Dozimi: c)
 - inflamacion i artikulationeve që vjen si pasojë e sarkoidozës (Dozimi: b në fillim të terapiisë)
 - artriti i rëndë që shfaqet pa shkakë të dukshme tek adoleshentët (artriti juvenli idioptak) dhe që prek organet e brendshme (sëmundja Still) ose që prek syrin (inflamacion i irisit dhe zonave përreth) dhe nuk i përgjigjet trajtimit lokal (Dozimi: a)
 - inflamacion i zemrës në ethet reumatike, në rastet e rënda mbi 2-3 muaj (Dozimi: a).

Sëmundjet e bronkeve të të mushkërive:

- astmë (Dozimi: a): në të njëjtën kohë rekomandohet ndjekja e një trajtimi bronkodilatator
- përkeqësim akut të sëmundjeve ekzistuese kronike obstruktive të rrugëve të frymëmarrjes (Dozimi: b), kohëzgjatja e rekomanduar e trajtimit: deri në 10 ditë
- disa sëmundje specifike të mushkërive si: inflamacioni akut i alveolave (alveolit) (Dozimi: b), ngurtësim dhe rimeodel të indit të mushkërive (fibrozë pulmonare) (Dozimi: b deri në d), inflamacion i foveave kronike të sarkoidozës në fazaat II dhe III (që shoqërohen me dispne, kollë dhe insuficiencë të mushkërive) (Dozimi: b)
- si trajtim parandalues në sindromën e ankthit të frymëmarrjes tek foshnjat e lindura para kohe (Dozimi: b, i përsëritur dy herë)

Sëmundje të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes:

- forma të rënda të etheve nga barti të sëmundjeve alergjike në rastet kur glukokortikoidët të dhënë si spraj në hundë nuk kanë dhënë efekt (Dozimi: c)
- ngushtime akute të laringut ose trakseë: angioedemë, laringit obstruktiv (pseudo-krup) (Dozimi: b deri në a)

Sëmundje të lëkurës:

- sëmundje të lëkurës dhe membranave mukozë që për shkak të gravitetit dhe/ose përshirjes nga disa organeve nuk mund të trajtohen në mënyrë lokale me glukokortikoidë
- Këtu përfshihen:
 - reaksione alergjike dhe reaksione të ngjashme me to, reaksione alergjike të shoqëruara me infeksione: si p.sh. urtikaria akute, shoku anafilaktik
 - sëmundje të rënda të lëkurës, që shkatërrojnë pjesërisht lëkurën, rash-i ndaj barnave, eritema multiforme, nekroliza epidermale toksike (sindroma Lyell), pustuliozis akuta generalisata, eritema nodoze, dermatoza akute neutrofilike e shoqëruar me temperaturë (sindroma Sweet), dermatialergjik nga kontakti (Dozimi: b deri në a)
 - rash-i: si p.sh. rash i shaktuar nga një reaksion alergjik si dermatiti atopik ose dermatiti i kontaktit, rash i shaktuar nga patogjenë (ekzema numulari) (Dozimi: d deri në a)
 - sëmundje që shoqërohen me shfaqjen e pullave në lëkurë: si p.sh. sarkoidoza, inflamacioni i buzëve (granulomatous cheilitis) (Dozimi: b deri në a)

- sëmundje të rënda që shoqërohen me shfaqjen e fluskave në lëkurë: si p.sh. pemfigus vulgaris, pemfigusi buloz, pemfigusi benini i membranave mukozë, dermatoza IgA lineare (Dozimi: b deri në a)
- vaskuliti: si p.sh. vaskuliti alergjik, poliarteriti nodoz (Dozimi: b deri në a)
- çrregullime të sistemit imunitar (sëmundje autoimmune si p.sh. dermatomioziti, sklerodermia sistematike (në fazën e ngurtësimit), lupusi eritematoz diskoid kronik dhe shkakut kutan (Dozimi: b deri në a)
- sëmundje të lëkurës gjatë periudhës së shtatzënisë (shih gjithashtu pikat "shtatzënia" dhe "ushqimi me gjir"): si p.sh. Herpes gestacionitis, impetigo herpetiforme, (Dozimi: d deri në a)
- sëmundje të rënda të lëkurës që shoqërohen me eritemë, rrjepje, si p.sh. psoriaza pustulare, psoriasis buloza, psoriasis purpura, grupi i parapsoriazave (Dozimi: c deri në a)
- entitroderma, edhe e shoqëruar me sindromën Sezary (Dozimi: c në a)
- sëmundje të tjera të rënda: si p.sh. reaksioni Jarisch-Herxheimer ndaj penicilines gjatë trajtimit të sifilitit, hemangioma kavernoze me zhvillim të shpejtë, sëmundja Behçet, pioderma gangrenoze, fasciit eozinofilik, likeni planus ekzantanëtik, epidermaloia buloze e trashëguar (Dozimi: c në a).

Sëmundje të gjakut / sëmundje neoplazike

- sëmundje autoimmune të gjakut:
 - anemia e shaktuar nga shkatërrimi i ruazave të kuqe të gjakut nga vetë organizmi (anemia hemolitike autoimmune) (Dozimi: c deri në a)
 - purpura trombocitopenike idiopatike (sëmundja Werlhof) (Dozimi: a) fazat akute të rënies së vetë të plakëzave të gjakut (trombocitopenia intermitente) (Dozimi: a)
 - sëmundje malinje si p.sh.: leucemia akute limfoblastike (Dozimi: e) sëmundja Hodgkin (Dozimi: e) limfoma jo-Hodgkin (Dozimi: e) leucemia limfocitike kronike (Dozimi: e) makroglobulinemia Waldenstrom (Dozimi: e) mieloma e shumëfishtë (Dozimi: e) nivelet e larta të kalçiumit në gjak si pasojë e një sëmundjeje malinje ekzistuese (Dozimi: c deri në a)
 - parandalimi dhe trajtimi i të vjellave si pasojë e kemioterapisë (Dozimi: b deri në a).

Shënim:

Cutason mund të përdoret në fazat e avancuara të sëmundjeve malinje për lehtësimin e simptomave si: humbja e oreksit, humbja e peshës dhe dobësia e përgjithshme, pasi trajtme të tjera alternative nuk kanë patur sukses.

Sëmundje të sistemit nervor:

- disa forma të paralizës (myasthenia gravis), zgjedhja e parë është azatioprina
- sindroma kronike Guillan-Barré
- sindroma Tolosa-Hunt
- polineuropatia si pasojë e gamopatisë monoklonale
- skleroza e shumëfishtë (për zvogëlimin gradual të dozës pasi janë kryer perfuzionet me doza të larta glukokortikoidësh) e trajtimin e një ataku akut)
- disa forma epileptike tek foshnjët (krampet BNS)

Forma progresive specifike të sëmundjeve infektive:

- situata helmimesh në sëmundje të rënda infektive (në kombinim me antibiotikë / kemioterapi), si p.sh. meningitji tuberkular (Dozimi: b), forma të rënda të tuberkulozit pulmonar (Dozimi: b)

Sëmundje të syve (Dozimi: b deri në a)

- sëmundje dhe procese inflamatore që prekin syrin dhe orbitën e syrit: sëmundjet që prekin nervin optik (neuropati optike, si p.sh. arteriti me qeliza gigante që vjen si pasojë e problemeve të qarkullimit të gjakut ose dëmtimeve), sindroma Behçet, sarkoidoza, orbitopatia endokrine, enjja e dukshme e orbitës, reaksioni i fllakës së transplantit dhe disa sëmundje të koroidit si sëmundja Harada dhe oftalmia simpaktike.

Në sëmundjet e mëposhtme, Cutason mund të jepet vetëm atëhere kur trajtimi lokal nuk ka qenë i efektshëm:

- infamacioni i pjesëve të ndryshme të syrit:
 - infamacioni i dermës dhe indeve përreth, i kornesë ose i koroidit, inflamacioni kronik i dhomës përçjegëse për formimin e ujit në sy, konjunktivitë alergjik, dëgjjet nga substanca alkaline, inflamacioni i kornesës që vjen si pasojë e një sëmundjeje autoimmune ose sifilitit (në këtë rast është i nevojshëm një trajtim shtesë kundër patogjentit), inflamacioni i kornesë i shaktuar nga Herpes simplex (vetëm në rastet kur sipërfaqja e kornesë nuk është e dëmtuar dhe nën kontroll oftalmologjik rigoroz).

Crregullime gastrointestinale / sëmundje të mëlçisë:

- kollt ulçeror (Dozimi: b deri në c)
- sëmundje e Kohnit (Dozimi: b)
- sëmundje autoimmune të mëlçisë (hepatiti autoimun) (Dozimi: b)
- korrozion i ezofagut (Dozimi: a)

Sëmundje të veshkave:

- sëmundje autoimmune të veshkave: sëmundja Nil (glomerulonefriti me ndryshime të vogla) (Dozimi: a), glomerulonefriti ekstrakapilar proliferativ (glomerulonefriti me zhvillim të shpejtë) (Dozimi: a), doza sulmi zakonisht në kombinim me barna citostatikë, për zvogëlimin e dozës dhe përfundimin e trajtimit në sindromën Goodpasture, për vazhdimin e trajtimit afatgjatë të të gjitha formave të tjera (Dozimi: d)
- përhapje të indit lidhor në zonën mësim veshkave dhe legenit pa një shkak të përcaktuar (fibroza retroperitoneale) (Dozimi: b).

2. PËRPARA SE TË MERRNI CUTASON

Mos merrni Cutason nëse:

- keni mbindjeshmëri (alergji) ndaj prednizonit apo ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të Cutason.

Për trajtimin afatshkurtër me Cutason të sëmundjeve që mund të vënë jetën në rezik, nuk ka kundërlindikacione të mëtejshme (përveç reaksioneve të mbindjeshmërisë të sipërpërmendura).

Tregoni kujdes të veçantë me Cutason

- nëse nevojiten doza më të larta sesa ato të përdorura në terapinë e zëvendësimit të hormoneve.

Në sëmundjet e mëposhtme, Cutason duhet përdorur vetëm nëse mjeku juaj e sheh të domosdoshme. Njëkohësisht, nëse është e nevojshme, duhet marrë një trajtim shtesë që lufton mikroorganizmin trajtimin specifik.

- infeksione virale akute (lloga e dheneve, infeksionet nga herpes zoster, infeksionet nga herpes simplex, inflamacioni i kornesë i shaktuar nga virusi i herpesit)
- infeksione bakteriale akute dhe kronike
- infeksione mykotike (nga kërpudhat) që prekin organet e brendshme
- disa sëmundje të shaktuara nga parazitët (amebia, infeksionet nga krimbat)
- sëmundjet e nyjeve limfatike që vijnë si pasojë e vaksinës ndaj tuberkulozit (në rast se pacienti ka vuajtur nga tuberkulozi, njëkohësisht duhet marrë një trajtim me antituberkularë)
- hepatiti infektiv (hepatiti kronik aktiv HbsAg-pozitiv)
- poliomieliti
- 8 javë para dhe 2 javë pas vaksinimit me një vaksinë që përmban mikroorganizma të gjallë.

Gjithashtu, Cutason mund të përdoret në sëmundjet e mëposhtme, vetëm nëse mjeku juaj e sheh të nevojshme dhe nëse këto sëmundje trajtohen njëkohësisht me terapinë shtesë të nevojshme.

- ulçerat gastrointestinale
- hipertensioni vështërsisht i trajtueshëm
- diabeti i rëndë (diabeti me insuline) ose pesë me doza të vogla, mund të risë rrezikun për një infektion, përfshirë këtu organizma patogjenë që në kushte të tjera rrallë do ta shkaktonin atë.
- Vaksinimi me organizma patogjenë jo të gjallë është i mundur. Megjithatë, duhet theksuar se, doza të larta të Cutason mund të ndikojnë në përgjigjen e pacientit ndaj vaksinës.
- Gjatë trajtimit afatgjatë me Cutason, pacienti duhet të kryejë kontrolle të rregullta mjekësore (përfshirë ato okulistikë).
- Në pacientët diabetikë mund të jetë e nevojshme rritja e dozës së barnave antidiabetikë (insulina, tableta e marrja nga goja etj.). Këta pacientë duhet të kryejnë kontrolle të rregullta mjekësore për të mbajtur metabolizmin nën kontroll.
- Gjatë trajtimit afatgjatë me doza relativisht të larta të Cutason duhet treguar kujdes që të merret një sasi e mjaftueshme kaliumi (si p.sh. nga zarzavatet, bananet etj.) dhe të kufizohet sasia e kripës. Nivelet e kaliumit në organizëm duhen mbajtur nën kontroll nga mjeku.
- Nëse vuan nga hipertensioni i rëndë ose insuficienca e rëndë kardiake, duhet të kryeni kontrolle të vazhdueshme tek mjeku, pasi mund të ketë përkeqësim të gjendjes.
- Nëse gjatë trajtimit me Cutason kaloni një sëmundje që shoqërohet me temperaturë, pësoni një aksident apo i nënshtroheni një ndërhyrjeje kirurgjike, ju duhet të informoni mjekun për njëjtin aksident apo ndërhyrje për trajtimin në fjalë. Mund të jetë e nevojshme një rritje e përkohshme e dozës ditore të Cutason.
- Nëse trajtimi me Cutason zgjat për një periudhë afatgjatë, mjeku duhet t'ju pajisjë me një kartë specifike, të cilën duhet ta mbani gjithmonë me vete. Duke qenë se në varësi të dozës dhe kohëzgjatës së trajtimit mund të ndodhin çrregullime në metabolizmin e kalçiumit, duhen marrë masa për parandalimin e osteoporozës. Kjo mund të ndodhë veçanërisht në pacientët që kanë disa faktorë rreziku si: trashëgimia familjare, moshë e madhe, marrja e panjftueshme e kalçiumit dhe proteineve, pirja e duhanit, konsumi i tepërt i alkoolit, periudha pas menopauzës dhe mungesa e aktivitetit fizik. Për të parandaluar këto çrregullime duhet marrë një sasi e mjaftueshme kalçiumi, vitaminë D dhe të kryhet aktivitet fizik. Në rastet e një osteoporozë ekzistente duhet marrë gjithashtu një terapi shtesë e përshtatshme.
- Pas ndërprerjes ose përfundimit të trajtimit afatgjatë me Cutason duhet të merren në konsideratë rrezikët e mëposhtme:

- rikthimi ose përkeqësimi i sëmundjes ekzistuese, insuficiençë akute e gjendrës mbiveshkore (veçanërisht në situata ku organizmi është në gjendje stresi si p.sh. gjatë një infeksioni, pas një aksidenti, stres fizik të rritur), shenja dhe simptoma që vijnë nga ndërprerja e trajtimit me kortizonikë. Në pacientët që trajtohen me Cutason mund të shfaqen sëmundje virale të rënda. Veçanërisht të rrezikuar janë fëmijët me çrregullime të sistemit imunitar (dobësim të sistemit imunitar) ose persona që nuk kanë kaluar frutthin ose linë e dheneve. Nëse kësa persona, gjatë trajtimit me Cutason, bien në kontakt me persona që jo kalojnë sëmundjet e sipërpërmendura, duhet të kontaktojnë menjëherë mjekun. Në këto raste mund të jetë e nevojshme të ndërmerret një terapi parandaluese.

Pasojat mbi testet laboratorike
Mund të ulët përgjigja e lëkurës ndaj testeve alergjike.

Në fillim të trajtimit me Cutason për mastienia gravis mund të shfaqet përkeqësim i gjendjes. Në këtë rast, përshatja e dozës duhet kryer pranë strukturave spitalore. Duhet patur veçanërisht kujdes gjatë fillimit të trajtimit me Cutason nëse pacienti paraqet probleme të rënda në zonën e fytyrës, fytyt dhe insuficiencë në frymëmarrje.

Trajtimi me Cutason mund të maskojë shenjat e një infeksioni, duke vështërsuar kështu identifikimin e tij. Duke marrë parasysh faktin që Cutason mund të përdoret në pesë me doza të vogla, mund të risë rrezikun për një infektion, përfshirë këtu organizma patogjenë që në kushte të tjera rrallë do ta shkaktonin atë. Vaksinimi me organizma patogjenë jo të gjallë është i mundur. Megjithatë, duhet theksuar se, doza të larta të Cutason mund të ndikojnë në përgjigjen e pacientit ndaj vaksinës.

Gjatë trajtimit afatgjatë me Cutason, pacienti duhet të kryejë kontrolle të rregullta mjekësore (përfshirë ato okulistikë).

Në pacientët diabetikë mund të jetë e nevojshme rritja e dozës së barnave antidiabetikë (insulina, tableta e marrja nga goja etj.). Këta pacientë duhet të kryejnë kontrolle të rregullta mjekësore për të mbajtur metabolizmin nën kontroll.

Gjatë trajtimit afatgjatë me doza relativisht të larta të Cutason duhet treguar kujdes që të merret një sasi e mjaftueshme kaliumi (si p.sh. nga zarzavatet, bananet etj.) dhe të kufizohet sasia e kripës. Nivelet e kaliumit në organizëm duhen mbajtur nën kontroll nga mjeku.

Nëse vuan nga hipertensioni i rëndë ose insuficienca e rëndë kardiake, duhet të kryeni kontrolle të vazhdueshme tek mjeku, pasi mund të ketë përkeqësim të gjendjes.

Nëse gjatë trajtimit me Cutason kaloni një sëmundje që shoqërohet me temperaturë, pësoni një aksident apo i nënshtroheni një ndërhyrjeje kirurgjike, ju duhet të informoni mjekun për njëjtin aksident apo ndërhyrje për trajtimin në fjalë. Mund të jetë e nevojshme një rritje e përkohshme e dozës ditore të Cutason.

Nëse trajtimi me Cutason zgjat për një periudhë afatgjatë, mjeku duhet t'ju pajisjë me një kartë specifike, të cilën duhet ta mbani gjithmonë me vete. Duke qenë se në varësi të dozës dhe kohëzgjatës së trajtimit mund të ndodhin çrregullime në metabolizmin e kalçiumit, duhen marrë masa për parandalimin e osteoporozës. Kjo mund të ndodhë veçanërisht në pacientët që kanë disa faktorë rreziku si: trashëgimia familjare, moshë e madhe, marrja e panjftueshme e kalçiumit dhe proteineve, pirja e duhanit, konsumi i tepërt i alkoolit, periudha pas menopauzës dhe mungesa e aktivitetit fizik. Për të parandaluar këto çrregullime duhet marrë një sasi e mjaftueshme kalçiumi, vitaminë D dhe të kryhet aktivitet fizik. Në rastet e një osteoporozë ekzistente duhet marrë gjithashtu një terapi shtesë e përshtatshme.

Pas ndërprerjes ose përfundimit të trajtimit afatgjatë me Cutason duhet të merren në konsideratë rrezikët e mëposhtme:

rikthimi ose përkeqësimi i sëmundjes ekzistuese, insuficiençë akute e gjendrës mbiveshkore (veçanërisht në situata ku organizmi është në gjendje stresi si p.sh. gjatë një infeksioni, pas një aksidenti, stres fizik të rritur), shenja dhe simptoma që vijnë nga ndërprerja e trajtimit me kortizonikë. Në pacientët që trajtohen me Cutason mund të shfaqen sëmundje virale të rënda. Veçanërisht të rrezikuar janë fëmijët me çrregullime të sistemit imunitar (dobësim të sistemit imunitar) ose persona që nuk kanë kaluar frutthin ose linë e dheneve. Nëse kësa persona, gjatë trajtimit me Cutason, bien në kontakt me persona që jo kalojnë sëmundjet e sipërpërmendura, duhet të kontaktojnë menjëherë mjekun. Në këto raste mund të jetë e nevojshme të ndërmerret një terapi parandaluese.

Pasojat mbi testet laboratorike
Mund të ulët përgjigja e lëkurës ndaj testeve alergjike.

Fëmijët

Duke qenë se trajtimi me Cutason mund të frenojë rritjen tek fëmijët, ky bar duhet përdorur vetëm nëse mjeku e sheh të nevojshme dhe rritja e fëmijës duhet monitoruar vazhdimisht.

Pasojat e keqpërdorimit për qëllime dopingu
Trajtimi me Cutason mund të japë një përgjigje pozitive në testet për doping. Megjithëse nuk mund të parashikohen pasojat për shëndetin e personave që përdorin Cutason për qëllime dopingu, nuk mund të përjashtohen pasojat e rënda.

Marrja e Cutason me barna të tjera

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse jeni duke marrë/përdorur apo keni marrë/përdorur së fundmi barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetën e mjekut.

Cilat janë barnat që mund të ndikojnë në efikasitetin e Cutason?

- barnat që oxisin metabolizimin nga mëlçia (barbiturati, fenitoina, primidoni [për trajtimin e konvulsioneve], rifampicina [për trajtimin e tuberkulozit]);
- efikasiteti i Cutason mund të zvogëlohet.

- disa hormone seksuale femërore, si p.sh. kontraceptivët: efikasiteti i Cutason mund të rritet.

- barna që veprojnë kundër prodhimit të tepërt të aciditetit në stomak (antiacide): në pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike të mëlçisë mund të jetë e nevojshme rritja e dozës.

Si ndikon Cutason në veprimin e barnave të tjerë?

Marrja në të njëjtën kohë e Cutason me

- barna që veprojnë në tonusin kardiak (glikozide kardiake): duke qenë se Cutason mund të shkaktojë mungesë të kaliumit në organizëm, efekti i këtyre barnave mund të rritet

- barna diuretikë dhe laksativë: rritet efekti i tyre mbi jashtëqijen e kaliumit

- barna që trajtojnë diabetin (antidiabetikë/insulina): mund të zvogëlohet efekti hipoglicemik

- antikoagulantë (antikoagulantë orallë, derivatet e kumarinave): efekti i tyre mund të zvogëlohet

- barna kundër inflamacionit dhe reumatizmës (salicilatet, indometacina dhe barna të tjera anti-inflamatorë [osterocidë]): mund të rritet rreziku për ulçer dhe hemorragji gastrointestinale

- disa barna që shkaktojnë lëshim të muskujve (relaksantë muskularë jo-pedarizues): koha e relaksimit të muskujve mund të zgjatet

- disa barna oftalmologjike (atropina) dhe barna që veprojnë në mënyrë të ngjashme (antikolinergjikë të tjerë): mund të ndodhë rritje e mëtejshme e presionit intraokular

- barna për trajtimin e sëmundjeve të shaktuara nga krimbat (prazikuanteli): mund të zvogëlohet efikasiteti i këtij bari

- barna për trajtimin e malaries dhe sëmundjeve reumatike (klorokina, hidroklorokina, meflokina):

- mund të rritet rreziku për miopati dhe kardiomiopati

- hormoni i rritjes (somatotropina): veçanërisht doza të mëdha të Cutason mund të zvogëlojnë efikasitetin e këtij bari

- proliferina (një hormon i turrit të mesëm): frenohet rritja e hormonit stimulator të tiroides (TSH)

- ciklosporina (përdoret për të frenuar sistemin imunitar të organizmit): rriten nivelet e ciklosporinës në gjak; kjo mund të çojë në rritje të rrezikut për konvulsione

- disa barna që përdoren për të ulur presionin e gjakut (ACE inhibitorë): rritet rreziku për diskrazi të gjakut

Shtatzënia dhe ushqimi me gj

Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni/përdorni çdo bar.

Shtatzënia

Gjatë periudhës së shtatzënisë, ky bar mund të merret vetëm me përshkrimin e mjekut. Informoni mjekun tuaj nëse jeni shtatzënë. Gjatë trajtimit afatgjatë me Cutason në periudhën e shtatzënisë nuk mund të përjashtohen edhe çrregullime në rritjen e fetusit. Nëse Cutason merret në periudhën e fundit të shtatzënisë mund të shfaqet insuficiençë e gjendrës mbiveshkore tek i porsalinduri.

Ushqimi me gj

Prednizoni kalon në qumështin e gjirit. Dëri tani nuk njihen raste të dëmtimit të fetusit. Megjithatë, nevojë për administrimin e Cutason gjatë ushqimit me gj, duhet shqyrtuar me kujdes. Nëse nevojiten doza të larta të Cutason ju nuk duhet të ushqeni fëmijën me gj.

Efektet mbi drejtimin e automjetit dhe përdorimin e makinave
Dëri tani, nuk ka asnjë dëshmi se Cutason ndikon në aftësinë për drejtimin e automjetit apo përdorimin e makinave. Kjo vlen edhe për personat që punojnë pa një mbështetje sigurie.

Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Cutason

Ky bar përmban laktozë. Nëse keni një intolerancë të njohur ndaj disa lloje sheqerash pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Cutason.

3. SI TA MERRNI CUTASON

- Gjithmonë merrni Cutason ashtu siç ju ka thënë mjeku juaj.
- Doza individuale përcaktohet nga mjeku juaj.
- Ju lutemi, ndiqni përshkrimin e recetës, përmiryshe Cutason mund të mos veprjë siç duhet.
- Nëse nuk jeni i sigurt, konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga mjeku, doza e zakonshme është: **Si terapi e zëvendësimit të hormoneve (pasi ka kaluar moshë e rritjes)**

5 deri në 7.5 mg prednizon / ditë, e dhënë në dy doza të ndara (në mëngjes dhe në mesditë, në hiperplazinë kongjenitale të gjendrës mbiveshkore në mëngjes dhe në darkë); nëse është e nevojshme, si mjekim plotësues mund të merret dhe një mineralokortikoid (fludokortizon). Në situata të veç