

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér përdoruesin

Virzin

Krem – 5 % (Aciklovir)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshruar pér ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësitet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Virzin dhe përse përdoret
- Përpura se të përdorni Virzin
- Si ta përdorni Virzin
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Virzin
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË VIRZIN DHE PËRSE PËRDORET

Virzin ka si lëndë vepruese aciklovir, i cili është një frenues i replikimit të ADN virale duke interferuar me ADN-polimerazën. Dozat e Virzin që administrohen lokalish kanë një përhithje minimale. Acikloviri jashtëqitet nga veshkat me filtrin glomerular dhe sekretum tubular. Virzin krem përdoret pér trajtimin fillestar dhe rekurzent të infeksioneve Herpes simplex të lëkurës, labial dhe gjenital.

2. PËRPARA SE TË PËRDORNI VIRZIN

Mos përdorni Virzin:

- në qoftë se jeni alergjik nga acikloviri ose përbërësit e tjerë të kremit dhe në qoftë se pacienti ka ndonjë histori tjetër alergjie nga antiviralë të tjerë;
- në qoftë se pacienti është fëmijë nën 2 vjeç.

Tregoni kujdes të veçantë me Virzin

Virzin krem është vetëm pér përdorim dermatologjik dhe nuk duhet të përdoret në sy, në membranat mukoze të gojës ose vaginës, sepse mund të shkaktojë irritim lokal.

Marrja e barnave të tjera:

Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë /

përdorur ose keni marrë / përdorur kohë e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj pér trajtimin me Virzin në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit. Megjithatë, përvaja klinike nuk ka identifikuar ndonjë ndërveprim të aciklovirit krem si rezultat i administrimit lokal ose sistemik të barnave të tjerë njëkohësisht me të.

Shtatzënia

Kërkon këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të përdorni këtë bar.

Virzin, megjë ka si lëndë vepruese aciklovir, nuk duhet të përdoret gjatë shtatzënisë, përvëç rasteve kur të mirat që sjell bari justifikojnë rrezikun mbi fetusin.

Ushqimi me gjji

Nuk dihet aksoma nëse pas aplikimit lokal të kremit të aciklovirit, lënda aktive kalon apo jo në qumështin e gjirit. Duhet të tregohet kujdes këtij bar përdoret nga nënët që ushqejnë me gjji foshnjet.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Efekti i këtij bari mbi aftësinë pér të drejtuar automjetin dhe përdorur makineri është i padëmshëm.

Informacione të rëndësishme pér disa nga përbërësit e Virzin

Ky bar përbën:

- alkol cetilik, i cili mund të shkaktojë reaksione lokale në lëkurë (p.sh. dermatit kontakti)
- propilen glikol, i cili mund të shkaktojë irritim të lëkurës.

3. SI TA PËRDORNI VIRZIN

Gjithmonë përdoreni Virzin sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e aciklovirit janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Pér trajtimin e infeksioneve virale të formave të përshkruara më lart rekombandohet aplikimi i një sasisë të mjaftueshme kremit sa pér të mbuluar plotësisht lezonet, çdo 4 orë, 5 herë në ditë, pér 5 ditë. Në qoftë se pas 5 ditësh nuk arrihet shërimi i plotë, atëherë mjekimi mund të vazhdojë edhe pér 5 ditë të tjera. Doza që aplikohet varet nga sipërfaqja totale e lezonave.

Doza mund të ketë nevojë të rritet ose të reduktohet. Mjeku juaj duhet t'ju këshillojë si të veproni.

Gishti ose doreza prej gome që përdoret pér aplikimin e kremit nuk duhet të prekë pjesë të tjera të trupit ose persona të tjerë, sepse mund t'i transmetohet infekzioni në vendet ku preken. Terapija duhet të fillojë sa më shpejt të jetë e mundur. Është veçanërisht e rëndësishme që

mjekimi i episodeve rekurrente të fillohet gjatë periudhës prodromale ose sapo të shfaqen simptomat.

Në qoftë se keni përdorur më shumë Virzin

Në qoftë se keni përdorur më shumë Virzin se sasia që duhet të përdorimit, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën pér të marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet të ndërmerrin.

Raste mbidozimi nuk njihen sepse përhithja nëpërmjet lëkurës është minimale.

Në qoftë se keni harruar të përdorni Virzin

Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), përdorni dozën në vazhdim kur të jetë koha pér përdorimin e zakonshëm të saj. Mos përdorni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) pér të plotësuar dozën (dozat) e harruar(a). Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjithë barnat e tjera, Virzin mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston.

Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.

Efektet e padëshiruara që mund të shfaqen janë:

- tharje dhe deskuamim i lëkurës;
- pickim ose djegje kalimtare;
- prurit;
- rash.

Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkësitet, ose në qoftë së vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI VIRZIN

Mbajeni larg fëmijëve.

Mos e përdorni kremin Virzin pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.

Mos e ruani mbi 25°C.

Ruajeni në paketimin original pér ta mbrojtur nga drita.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përban Virzin

Lënda vepruese është aciklovir.

1 g krem përban 50 mg aciklovir. Përbërësit e tjerë janë: Glicerolmonostearat dhe polietilenglikol - 30 - stearat, dimetikon 350 fluid, alkool cetilik, parafinë e bardhë, vaj parafine, propilenglikol, ujë i pastruar.

Përbajtja e paketimit

Kuti kartoni me 1 tub 5 g ose 15 g.

Mbajtësi i autorizimit të tregtimit dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Ruga "Myslym Keta"
Tel.Fax: 00355 4 23 62 800
Tiranë - SHQIPERI

Ky fletëudhëzues u rishikua pér herë të fundit në Prill 2015.

CROPPING AREA 12 x 19 cm

PAY ATENTION, all the layers are visible.

If you have to print this document please check or uncheck the specific layers.

SPECIFICATION