

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

JODEX

Spraj - 8.5% - 30ml (Povidon jod)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoset ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjeter anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Jodex dhe përsë përdoret
- Përparrë se të merrni Jodex
- Si ta merrni Jodex
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Jodex
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË JODEX DHE PËRSË PËRDORET

Povidonjodi është një kompleks i jodit me povidonin (polivinilpirolidon), kurse povidoni është polimer sintetik hidrofil që luani rollin e bartës së lidhur. Ky polimer nuk ushton veprim antibakteror, por afati t' i lartë për membranën qelizore, kurse në trajtë kompleksi me jodin, parë në trajtë të povidonjodit, çiron jod t'i lirë drejtëpërdrejt në sipërfaqen e qelizës bakterore. Jodex – Spray – 8.5% indikohet si dezinfektant orino-laringologjik. Lënda kryesore vepruese është jodi, i cili çlirohet gjatë kontaktit të povidonjodit me mukozat. Allantoina mbrohet nga dëmtimi. Ky bar përdoret:
- si mjekim plotësues në infeksionet e hapësirës së gojës, qjellzës, grykës dhe gjuhjës;
- në infeksionet pas veprimeve kirurgjikale në gojë;
- gjatë sëmundjeve gripale që shoqërohen me gërvishjtë dhe dhimbje të tyftit;
- në infeksionet kronike të zgavrës së gojës;
- në anginat streptotoksike (i shoqëruar me antibiotik).

2. PËRPARA SE TË MERRNI JODEX

Mos merrni Jodex:

- në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj povidonjodit ose ndaj ndonjë prej përbërësive të tjerë të barit pasi mund të shfaqen reaksione alergjike (përfshirë dhe anafilaksinë).

Të evitohet përdorimi i rregullt apo i zgjatur në të sëmurët me patologji të tiroidës apo në pacientët që janë nën mjekim me litium. Barnat që përbmajnë jod nuk duhet të përdoren 2 javë para që pas kurimit me jod radioaktiv si dhe gjatë dëmtimitve serioze të funksionit të mushkërive.

Tek pacientët me dëmtimet të mëdha duhet të përdoren vetëm me rekomandim të mjekut.
Ky bar nuk duhet të përdoret në fémijet nën 8 vjet.

Tregoni kujdes të veçantë me Jodex

Pyesni mjekun tuaj përparrë se të merrni Jodex. Gjatë spërkatjes në mukozën e gojës duhet të mbylli sityt, të mos gjalliteni që të mos merrni frymë. Këto rekomandime duhen patur parasysh sidomos tek fémijet.

Gjatë përdorimit të povidonjodit njëkohësisht me barna të tjerë në brendësi të gojës duhet të këshilloheni me mjekun.

Këshillohet të evitohet përdorimi gjatë shtatzënisë dhe ushqimit me gji.

Në qoftë se nuk keni shenja përmirësimi ose ju shfaqen efekte anësore duhet të konsultoheni me mjekun.

Marrja e barnave të tjerë

Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjerë, përfshirë të ato marra pa recetë. Mos haroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me Jodex në qoftë se ju jepet ndonjë bar i tjeter gjatë trajtimit. Ndërveprimet klinikisht të rëndësishme vërehen pas përhithjes sistemeke të Jodex.

Është vegenërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në djeni të faktit që ju jeni trajtuar me sulfadiazinë argjendike ose me klorheksidinë pasi përdorimi në të njëjtën kohë me povidonjod mund të shkaktojë çaktivizim të jodit.

Shtatzënia dhe Ushqimi me gji

Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përparrë se të merrni këtë bar.

Këshillohet të evitohet përdorimi gjatë shtatzënisë dhe ushqimit me gji.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinave
Nuk nijhen efekte të këtij bari në aftësinë për të drejtuar automjetin ose për të përdorur makinari.

3. SI TA MERRNI JODEX

Gjithmonë merreni Jodex sipas këshillës së mjekut. Është e rëndësishme që të ndiqni udhëzimet e mjekut tuaj me përpikmëri dhe asnjëherë mos ta ndryshoni dozën vetë, sidom që të ndiheni. Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Jodex – Spray duhet spërkuratur me kujdes më sipërfaqen e mukozës së gojës, pa e futur tubin shumë në thellësi.

Fémijet mbi 8 vjec dhe të riturit: 2-3 sprucime në anën e djathë dhe të majtë, deri katër herë në ditë.
Në raste të vëçanta mund t'i aplikohet edhe më shpesh (çdo 4 orë). Para përdorimit duhet të shpëlhahet goja me ujë të ngrohtë.

Në qoftë se keni marrë më shumë Jodex

Në qoftë se keni marrë më shumë Jodex se sasia që duhet të merrni ose në qoftë se fémijet e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitali ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim përrrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerrit.

Efektit anësore që vijnë si pasojë e mbidozimit të Jodex janë të rralla.

Në qoftë se keni harruar të merrni Jodex

Në qoftë se harroni një dozë Jodex merreni atë sa më shpejt. Në qoftë se është pothuase koha për dozën tjeter, merreni atë dhe kalojeni dozën e humbur. Mos merrni dozën ekstra për të plotësuar dozën e humbur.

Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË JODEX

Si të gjithë barnat e tjerë, Jodex mund t'i shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza reduktohet ose trajtimi ndërprerit. Disa efekte anësore mund t'i ndodhni në fillim të trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit. Povidonjodi mund t'i japë reaksione mbindjeshmërie që shfaqen me irritimi të lëkureve dhe të membranave mukozë, skruaje dhe kruarje në vendin e përdorimit. Në rast se gjallitet mund t'i japë irritim gastrointestinal. Flisni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se vëreni efekte të tjera jo të përmendura më sipër.

5. SI TA RUANI JODEX

Ruajeni në një vend të thatë dhe të freskët në një temperaturë jo më shumë se 25°C.

Duhet të ruhet nga drita dhe lagështia.

Mos e ruani në ngrirje.

Mos e përdorni Jodex pas datës së skadencës.

Mbajeni barin tuaj në një vend të sigurt ku fémijet tuaj nuk mund ta marrin. Bari juaj mund t'i dëmtojë atë.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbën Jodex - spray

Lënda vepruese është Povidonjod.

1 flakon 30 ml tretësirë përbën 2.55 g povidonjod (8.5%). Përbërës të tjerë: allantoinë, propileniglikol, alkool etilik, mentol, acid citrik, citrat natriumi, ujë për injekzion.

Përbajtja e paketimit

Kuti me 1 flakon plastik 30 mL i pajisur me pompë sprucimi.

Shpjegues i ikonave ilustruese në paketim:



Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAH) dhe prodhuesi:

PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë - Shqipëri

Ky fletëudhëzues u rishiku për herë të fundit në Shtator 2013.

i PACKAGE LEAFLET:
Information for the user

JODEX

Spray – 8.5% - 30ml (Povidone iodine)

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

- What Jodex is and what it is used for
- Before you take Jodex
- How to take Jodex
- Possible side effects
- How to store Jodex
- Further information

1. WHAT JODEX IS AND WHAT IT IS USED FOR

Povidone-iodine is a complex of iodine with povidone (polyvinylpyrrolidone), whereas povidone is a hydrophilic synthetic polymer which is used as a carrier for iodine.

This polymer does not have antibacterial activity, but has a high affinity for the cell membrane, whereas in the form of complex with iodine, so in the form of povidone-iodine, gradually releases iodine, closely to the bacterial cell surface.

Jodex – Spray – 8.5% is indicated as an otolaryngologic disinfectant. The main active substance is iodine, which is released during contact of povidone-iodine with mucosa. Allantoin protects mucosa from damage.

This medicine is used:
- as an additional treatment in the infections of the oral cavity, palate, throat and tongue;
- in post-operation infections of the oral cavity;
- during flu associated with scratches and sore throat;
- in oral chronic infections;
- in streptococcal angina (in combination with antibiotics).

2. BEFORE YOU TAKE JODEX

Do not take Jodex:

- if you are hypersensitive (allergic) to povidone-iodine or to any of the other ingredients of the medicinal product because allergic reactions may appear (including anaphylaxis). Prolonged and regular use should be avoided in patients with thyroid pathology or in patients which are being treated with lithium. Medicines containing iodine must not be used 2 weeks before and after the treatment with radioactive iodine and also if the patient has severe damages of the pulmonary function. In patients with liver impairment this medicine should be used only with medical prescription. This medicine must not be used in children under 8 year old.

Take special care with Jodex

Ask your doctor before you take Jodex. During spraying in oral mucosa, you should close your eyes, do not swallow and do not breathe. These recommendations are particularly relevant to the children. When povidone-iodine is used at the same time in the mouth with other medicines, you should consult a doctor. Povidone-iodine should not be used during pregnancy and breast-feeding.

If you do not have signs of improvement or side effects appear, you should consult a doctor.

Taking other medicines

Please, tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription. Do not forget to inform your doctor about your treatment with Jodex if you are given another medicine during treatment. Important clinical interactions are observed after systemic absorption of Jodex.

It is particularly important to inform your doctor that you are treated with silver sulfadiazine or chlohexidine because concomitant use with povidone-iodine may cause inactivation of iodine.

Pregnancy and breastfeeding

Ask for your doctor or pharmacist advice before taking this medicine. It is advised to avoid use of this medicine during pregnancy and breastfeeding.

Driving and using machines

There are no known effects of this medicine on the ability to drive or use machines.

3. HOW TO TAKE JODEX

Always take Jodex according to medical advice. It is important to follow strictly your medical advice and never change the dose yourself, no matter how you feel. If you are not sure, contact your doctor or pharmacist.

Jodex – Spray should be sprayed carefully on the surface of the mouth mucosa, without inserting the tube too deeply.

Children over 8 years and adults: 2-3 sprays on the right and left side, up to 4 times a day.

In particular cases may be applied more often (every 4 hours). Before use, the mouth should be rinsed with warm water.

If you take more Jodex than you should

If you take more Jodex than you should, or if the children take it accidentally, please contact your doctor, the hospital or any medical care site to seek advice on the risk and the appropriate measures.

Side effects because of overdose with Jodex are rare.

If you forget to take Jodex

If you forget taking one dose Jodex take it as soon as possible. If it is about the time for the next dose, take it and skip the missed dose. Do not take a double dose to make up a forgotten dose.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, Jodex can cause side effects, although not everybody gets them. Most of the side effects are dose related and disappear when the dose is reduced or the treatment is stopped. Some side effects may appear in the beginning of the treatment and disappear spontaneously during treatment.

Povidone-iodine can cause hypersensitivity reactions which appear with irritation of the skin and mucous membranes, redness and itching at the application site.

If it is swallowed may cause gastrointestinal irritation. Talk to your doctor or pharmacist, if you notice other side effects not listed above.

5. HOW TO STORE JODEX

Store in dry, cool places, at temperatures less than 25 °C.

Protect it from light and humidity.

Do not freeze.

Do not use Jodex after the expiry date.

Keep your medicine in a safe place where your children can not reach it. Your medicine may harm them.

6. FURTHER INFORMATION

What Jodex – spray contains

The active substance is Povidone-iodine.

1 flacon of 30 ml solution contains 2.55 g povidone-iodine (8.5%). Other ingredients: allantoin, propylene glycol, ethanol, menthol, citric acid, sodium citrate, water for injection.

Contents of the pack

Box with 1 plastic flacon of 30 ml with spraying system.

Explanation of illustrated icons in the packing:



Marketing Authorisation Holder (MAH) and Manufacturer

PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë - ALBANIA

This leaflet was last revised in September 2013.